

Pristanak za uzimanje kalij-jodid tableta

Dragi roditelji! Dragi staratelji!

Nesreća u nuklearnom reaktoru Černobil je dovela do jakog porasta broja slučajeva karcinoma štitnjače u djece i mladih uvjetovanog zračenjem u vrlo jako opterećenim područjima oko Černobila. Uzrok tomu je radioaktivni jod koji se kod teških nesreća u nuklearnim reaktorima oslobađa u velikim količinama. Nakon što uđe u tijelo odlaže se u štitnjači i tamo dovodi do lokalno velikog opterećenja zračenjem.

Blagovremeno uzimanje kalij-jodid tableta zasićuje štitnjaču stabilnim jodom i tako sprječava odlaganje radioaktivnog joda. Na taj način se opterećenje štitnjače zračenjem, a samim time i nastupanje karcinoma štitnjače uvjetovanog zračenjem praktično svodi na nulu. Uvjet za to je, da se tablete uzmu prije nastupanja radioaktivnog oblaka.

Blagovremeno uzimanje kalij-jodid tableta nudi vrlo djelotvornu zaštitu protiv karcinoma štitnjače uvjetovanog zračenjem.

Da bi se omogućilo blagovremeno uzimanje, u školama i internatima se skladište kalij-jodid tablete. Iste se mogu dati vašem djetetu samo sa vašim prethodnim pristankom. Potpisom niže navedene izjave o pristanku možete omogućiti davanje vašem djetetu.

U slučaju nesreće u nuklearnom reaktoru kalij-jodid tablete se daju samo nakon izričitog zahtijevanja od strane zdravstvenih službi.

Molimo Vas da prije vašeg pristanka pažljivo pročitate priložene podatke iz informacija za upotrebu kalij-jodid tableta.

Direktorica

IZJAVA PRISTANKA

Ime djeteta: _____ datum rođenja: _____

Ime staratelja: _____

DA, dajem pristanak (za vrijeme trajanja pohađanja ustanove) da se mome djetetu nakon što to budu zahtijevale zdravstvene službe daju kalij-jodid tablete. Potvrđujem, da mi za moje dijete nisu poznate nepodnošljivosti i nuspojave za uzimanje tablete i da ću nakon što mi postojanje nepodnošljivosti ili nuspojava postane poznato, odmah o tome obavijestiti školu.

NE, ne dajem pristanak.

Datum: _____

Potpis: _____

Informacije o kalij-jodid tabletama (po smislu iz informacija za upotrebu)

Kalij-jodid tablete se ne smiju uzimati:

- Kod pojačane funkcije štitnjače
- Kod dobroćudnih čvorova u štitnjači, koji se ne terapiraju. Kod takozvanih neterapiranih "vrućih čvorova u štitnjači" postoji opasnost od masivne pojačane proizvodnje hormona štitnjače koja u najgorem slučaju može dovesti do reakcije srca i krvotoka opasne po život.
- Kod sumnje u postojanje zloćudnog tumora štitnjače. Tumori štitnjače se terapiraju sa radioaktivnim jodom. Ako se kalij-jodid uzima u velikim količinama moguće je da liječenje tumora postane nemoguće.
- Kod alergija (preosjetljivosti) protiv joda. To je vrlo rijetko i ne smije se zamijeniti sa učestalom alergijom protiv kontrastnih sredstava (služi za bolji prikaz različitih organa u postupcima sa slikama kao primjerice u dijagnostici pomoću rentgena).
- Kod alergija protiv drugih sastojaka tableta (kukuruzni škrob, laktoza-monihidrat, mikrokristalna celuloza, bazični butilmetacrilat-copolimer, magnezij-stearat)
- Kod ermatitisa herpetiformis Dühring (oboljenje, kod kojeg nastaju mjehurići, crvenilo kože, osip, pustule i svrab koji jako peče, prvenstveno na laktovima ili koljenima)
- Kod upala stjenki krvnih žila uvjetovanih alergijama (hipokomplementarni vaskulitis)

Poseban oprez kod uzimanja kalij-jodid tableta potreban je:

- kod oboljenja koja se odnose na dušnik. Davanjem visokih količina joda štitnjača može narasti, što će već postojeće sužavanje dušnika dodatno pogoršati.
- Ako se dijete liječi tvarima za usporavanje reakcije štitnjače (tireostatici). Upitajte molimo Vas Vašu liječnicu / Vašeg liječnika, da li Vaše dijete smije uzimati kalij-jodid tablete.

Uzimanje kalij-jodid tableta sa drugim lijekovima

- Na djelovanje kalij-jodid tableta utiču:

lijekovi, koji utiču na metabolizam štitnjače (npr. perklorat, ticioanat u koncentracijama preko 5 mg/dl). Oni suzbijaju prihvatanje joda u štitnjači.

- kalij-jodid tablete utiču na djelovanje:

tvari za usporavanje reakcije štitnjače (tireostatici)

Koje nuspojave su moguće?

Kao i kod svih lijekova i kod kalij-jodid tableta mogu nastupiti nuspojave, koje ne moraju nastupiti kod svakoga. Kod analize nuspojava kao osnova su uzeti sljedeći podaci učestalosti:

- Vrlo često (nastupile su kod više od 1 od 10 pacijenata)
- Često (nastupile su kod više od 1 od 100, ali manje od 1 od 10 pacijenata)
- Povremeno (nastupile su kod više od 1 od 1.000, ali manje od 1 od 100 pacijenata)
- Rijetko (nastupile su kod više od 1 od 10.000, ali manje od 1 od 1.000 pacijenata)
- Vrlo rijetko (nastupile su kod manje od 1 od 10.000 pacijenata)

Oboljenja probavnog trakta

Nadražaj želučane sluznice posebno može nastupiti kod uzimanja kalij-jodid tableta na prazan želudac.

Hormonalna oboljenja

Vrlo rijetko: Pojačana funkcija štitnjače uvjetovana jodom. Znakovi pojačane funkcije štitnjače mogu povećati puls, izazvati iznenadno jako znojenje, nesanicu, drhtavicu, proljev i gubitak težine usprkos povećanom apetitu.

Oboljenja krvnih žila

Rijetko: Upala krvnih žila (npr. Periarteritis nodosa)

Oboljenja imunološkog sistema

Rijetko: Jednokratno može nastupiti nepoznata alergija na jod. Pri tome mogu nastupiti alergične pojave kao što su to npr. crvenilo kože, svrab i žarenje u očima, kihavica, proljev, glavobolja i slični simptomi. Posebice kod postojećeg dermatitis herpetiformis Duhrin (oboljenje, kod kojeg nastupaju mjehurići, crvenilo kože, osip, pustule i svrab koji jako peče, prvenstveno na laktovima ili koljenima) moguće su reakcije opasne po život (vidi gore: kalij-jodid tablete se ne smiju uzimati)

Principijelno vrijedi:

Upitajte svoju liječnicu / svoga liječnika ili svoju apotekarku / svoga apotekara, ukoliko su Vam potrebne dalje informacije ili savjeti.